

Résumé (français et anglais)

Introduction : En Guinée, les 2/3 des nouveaux cas de tuberculose (TB) sont diagnostiqués au centre antituberculeux de Conakry (CAT). Dans le cadre du projet de collaboration entre les Programmes nationaux de lutte contre la TB et le VIH/SIDA, le dépistage et la prise en charge du VIH sont mis en place depuis mars 2009. L'objectif de ce travail est d'évaluer les résultats des 12 premiers mois de mise en œuvre de ces activités.

Méthode : Pour cette étude rétrospective descriptive, les données ont été recueillies à partir des outils de gestion mis en place pour la prise en charge des patients tuberculeux VIH+. Nous avons analysé les résultats de l'ensemble des patients inclus entre le 13/03/09, date de lancement du projet, et le 31/03/10.

Objectif : évaluer la mise en place du projet de dépistage du VIH au CAT de Conakry

Résultats : 4655 cas de TB ont été diagnostiqués. La proportion de patients dépistés pour le VIH est de 67,08%. Le taux de refus du dépistage a été de 0,7% parmi les patients ayant bénéficié d'un conseil pré-test individuel. Sur la période étudiée, le taux de résultat positif du VIH chez les patients tuberculeux était de 16,75%, soient 456 patients infectés par le VIH (97,58% VIH1 ; 2,42% VIH1/2). Les patients VIH+ étaient majoritairement des femmes (54,82%), et de la tranche d'âge 25-36 ans (61,4%). Les formes cliniques étaient surtout pulmonaires (62,93%, n=287), à frottis négatif dans 22,14% des cas (n=101), et extra pulmonaires dans 37,06% des cas. Cent pour cent des patients co-infectés ont démarré une prophylaxie au cotrimoxazole, 16,84% seulement avaient démarré un traitement ARV (n=82).

Conclusion : Le dépistage à l'initiative du soignant mis en œuvre au CAT à été efficace et bien accepté des patients..

Ces résultats préliminaires sont encourageants, et plaident pour l'extension du dépistage et de la prise en charge du VIH à tous les centres de prise en charge de la Tuberculose en Guinée.